



www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no Município de Peruíbe, São Paulo. Brasil

Registro documentado de Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no Município de Peruíbe, São Paulo. Brasil

por Bruno Lima
buiolima@gmail.com
e Marcio Riberio
marcio_monitor@hotmail.com

Abstract: The authors presents records of *Accipiter poliogaster*, or Grey-bellied Hawk in Peruíbe, São Paulo, Brazil. That is the first image of this raptor in this region, and the first in São Paulo State.

O Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) é o mais robusto representante do gênero (Sick, 1996), sendo uma espécie de ocorrência local, pouco conhecida. No Estado de São Paulo, habita de preferência as matas do interior, quase extinto atualmente (Willis).

A espécie carecia de um registro documentado no litoral de São Paulo, sendo que a única informação sobre sua ocorrência era a visualização feita por Pedro Develey em fevereiro de 1995, na Estação Ecológica Juréia-Itatins (E.E.J.I), no município de Peruíbe, Litoral Sul do Estado de São Paulo. Nessa ocasião, um adulto e um jovem sobrevoavam a Praia do Guarauzinho.

Em 13 de agosto de 2010, o ornitólogo Bruno Lima e o guia Márcio Ribeiro registraram uma fêmea adulta, também no município de Peruíbe.

Na ocasião, a espécie estava pousada no alto de uma árvore isolada de aproximadamente 20 metros de altura que, provavelmente, tratava-se de uma árvore emergente antes de a floresta ao redor ser suprimida. Eram 17:00 horas quando a espécie em questão foi avistada, permanecendo pousada por 10 minutos, sendo possível realizar um registro fotográfico (Figura 01). Do local onde estava, ela alçou vôo e sobrevoou uma área aberta (Figura 02) até pousar em um guanandi (*Calophyllum brasiliensis*) de aproximadamente 15 metros. Em poucos segundos a espécie partiu na direção de um pequeno morro isolado na planície.

O local do registro é conhecido como Zona Rural de Peruíbe (Figura 03), e dista cerca de 12 quilômetros do local onde Pedro Develey observara a espécie a 15 anos atrás.

Apesar de não ser tão distante da Praia do Guarauzinho, a Zona Rural de Peruíbe é distinta tanto em termos de estrutura: a Praia do Guarauzinho caracteriza-se por possuir uma faixa muito estreita ou mesmo ausente de vegetação de restinga, sendo que a vegetação predominante é Floresta Ombrófila Densa de Encosta que recobre os morros do embasamento cristalino, com uma altitude aproximada de 180 metros.

Já a Zona Rural de Peruíbe, caracteriza-se por ser uma extensa planície arenosa, recoberta por Floresta Alta de Restinga em Estágio Médio e Avançado de Regeneração, e Floresta Paludosa Sobre Substrato Turfosos. Possui apenas alguns poucos morros dispersos na planície, cuja altitude raramente ultrapassa 80 metros.

As áreas também são distintas em termos de ameaça, pois enquanto que a Praia do Guarauzinho encontra-se relativamente protegida dentro dos limites da E.E.J.I, as matas de baixada da Zona Rural de Peruíbe, que não encontram-se protegidas pelo Parque



www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de Tautató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no Município de Peruíbe, São Paulo. Brasil

Estadual da Serra do Mar, estão sendo destruídas pelo crescimento desorganizado do município e pela implantação de loteamentos e condomínios residenciais de veraneio.

Ao que tudo indica, ao menos no município de Peruíbe, *Accipiter poliogaster* habita tanto as formações secundárias da planície costeira quanto as florestas em melhor estado de conservação da encosta.

Não há informação disponível sobre a nidificação de *Accipiter poliogaster*, embora o fato de um indivíduo jovem ter sido observado na Praia do Guaraúzinho possa levar a supor que a espécie se reproduz na região.

Uma informação relevante acerca de sua provável reprodução na região é o fato de um indivíduo jovem ter sido registrado por Márcio Ribeiro (Figura 04) em 30 de outubro de 2010, a menos de um quilômetro do local do primeiro registro. Nessa ocasião, o indivíduo estava pousado em uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura em borda de mata, às 05:40 horas.

Devido à proximidade desses dois pontos de registro, é lícito supor que a espécie se reproduz na Zona Rural de Peruíbe, sendo necessário um maior esforço de observação nas florestas de restinga e nos pequenos morros.

Por tratar-se de uma espécie de hábitos ainda desconhecidos, como reprodução, comportamento e alimentação, e considerada quase ameaçada (*near threatened*) no Estado de São Paulo, faz-se necessário dispensar um maior esforço de observação na Zona Rural de Peruíbe, bem como a criação de unidades de conservação nas áreas remanescentes de floresta de restinga na região.


Agradecimentos

Somos gratos à João Marcelo da Costa e David Pasqualetti pela companhia durante essa expedição.

Referências Bibliográficas

SICK, H. (1997) *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
WILLIS E. O. & Oniki, Y. (2003) *Aves do Estado de São Paulo*. Rio Claro: Divisa

Fotos referidas





www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no Município de Peruíbe, São Paulo. Brasil

Figura 01: Fêmea de Tauató-pintado. Foto: Bruno Lima



Figura 02: Mesmo indivíduo, sobrevoando a região. Foto: Bruno Lima.




Figura 03: As vastas e inexploradas florestas de restinga da Zona Rural de Peruíbe. Foto: Bruno Lima.



www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de Tauató-pintado (*Accipiter poliogaster*) no Município de Peruíbe, São Paulo. Brasil



Figura 04: Imaturo de Tauató-pintado. Foto: Marcio Ribeiro.