



www.ultimaarcadenoe.com.br

Registro documentado de *Sporophila frontalis* no rio Preto, Itanhaém, SP, BR.
Por Antonio Silveira

Registro documentado de *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869), (Aves, Emberezidae), no rio Preto, Itanhaém, SP, Brasil.

Antonio Silveira R. dos Santos
Programa Ambiental: A Última Arca de Noé. São Paulo. Brasil.
www.ultimaarcadenoe.com.br

Resumo

O pixoxó *Sporophila frontalis*, ave endêmica do bioma Mata Atlântica e relacionada no rol das aves ameaçadas, tem sido muito pouco encontrada, no que resta de áreas naturais da área de sua distribuição. Um registro recente para o Estado de São Paulo é mostrado pelo autor.

Abstract

Sporophila frontalis (Pixoxó) is endemic bird of the Atlantic Forest biome and related on the list of threatened birds, has been very little found in the remaining natural areas of its distribution area. One record recent for the State of São Paulo are shown for the author.

Palavras chave: espécie endêmica; espécie ameaçada, *Sporophila frontalis*

Sporophila frontalis, o Pixoxó, ou em inglês Buffy-throated seedeater é ave da família Emberezidae, com 13,5 cm, de cor pardo-oliváceo, com estreita faixa pós-ocular, garganta e meio das partes inferiores brancas ou esbranquiçadas; centro do abdomen amarelado; asas com duas faixas amarelas transversais. A fêmea é parecida com o macho, porém mais esverdeada e sem a lista branca pós-ocular (Sick, 1997).

Espécie endêmica da Mata Atlântica do sudeste da América do Sul, ocorre do sul do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, este do Paraguai e Misiones na Argentina (Meyer de Schauensee, 1982), *Sporophila frontalis* consta da lista das aves ameaçadas de extinção - The ICPP/IUCN- Red Data Book (Collar et al. 1992).



www.ultimaarcadenoe.com.br Registro documentado de *Sporophila frontalis* no rio Preto, Itanhaém, SP, BR.
Por Antonio Silveira

É ave que habita o interior da mata e está associada a taquarais. Frequenta também regiões abertas como plantações de arroz e florescências de bambu Sick (1997). É encontrado muitas vezes juntamente com outros "papa-capins" na época de reprodução, a qual coincide com a florescência de várias gramíneas, também seu alimento.

Seu canto nada melodioso trata-se de uma sequencia estridente e honomatopaica descrita por Sick (1997) como: "Tchó-Tchó-Tchó-Tchóu". Sua vocalização é tão marcante que uma vez ouvida é difícil esquecer-la, o que facilita sua identificação ao ornitólogo ou ao birdwatcher. Aliás, o conhecimento da vocalização das aves é importante para os levantamentos da avifauna (Santos, 1994).

O processo de desaparecimento das áreas naturais está ligado ao desflorestamento, ao desenvolvimento industrial, a pressão demográfica e ainda devido a ação dos colecionadores, apesar da proibição legal de se apanhar espécimes da fauna silvestre (Lei 5.197/67 e Lei 9.605/98). Aliás, esses fatores aliados a falta de conscientização ecológica estão levando a grandes perdas da biodiversidade (Santos, 1995), incluindo aí as aves.

Assim, ante a necessidade de se conhecer os locais onde ainda ocorrem espécies ameaçadas de extinção como a em questão, para ajudar em necessários processos e medidas de preservação, temos visitado áreas naturais remanescentes do Estado de São Paulo, o que tem resultado em muitos registros ornitológicos importantes, como o aqui tratado.

No dia 31 outubro de 2014, vimos, ouvimos, fotografamos (Antonio Bordignon) e gravamos a vocalização de *Sporophila frontalis* em um taquaral à beira do rio Negro, município de Itanhaém, SP (24°08'33.58"S;46°48'50.05"O). Estávamos de barco a motor e nos aproximamos da margem para o registro. O registro está depositado em sites na internet (vide abaixo).

Temos a esperança de que o relato do presente registro pode colaborar com o "rastreamento" da atual aparente restrita ocorrência de *Sporophila frontalis*, uma das espécies de aves brasileiras ameaçadas de extinção, e colaborar com necessárias medidas de preservação das espécies e consequentemente de seu habitat natural, o que ajudará a outras inúmeras espécies da fauna do Brasil.

Bem como incentivar o emergente turismo de observação (Santos, 2004).

Agradecimentos: Agradecemos a companhia do professor geógrafo Rodrigo Ferraz, que deu apoio com o barco, a José Machado, que pilotou o barco, e a companhia do biol. Antonio Bordignon.



www.ultimaarcadenoe.com.br

Registro documentado de *Sporophila frontalis* no rio Preto, Itanhaém, SP, BR.
Por Antonio Silveira



Foto: Antonio Bordignon

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- COLLAR, N.J. et.al. Threatened Birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book, 3ª ed., ICBP, Cambridge, 1992. 1150 p.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. A guide to the birds of South America. Intercollegiate Press, 1982. 498 p.
- SICK, H. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 861.
- SANTOS, A.S.R DOS. A importância da vocalização na identificação das aves. Boletim do CEO- Centro de estudos Ornitológicos. Nº10, julho de 1994.
- SANTOS, A. S. R.dos. A Biodiversidade da Terra e o Desenvolvimento Sustentável. Revista dos Tribunais. nº716/7. junho/1995.
- SANTOS, A. S. R.dos. A força do turismo de observação. Suplemento de turismo do jornal O Estado de São Paulo. 24 de agosto de 2004.

Gravação depositada em:

- Programa Ambiental: A Última Arca de Noé :
(<http://www.ultimaarcadenoe.com.br/?p=15357>)

The IBC- Internet Bird Collection:

(<http://ibc.lynxeds.com/sound/buffy-fronted-seedeater-sporophila-frontalis/male-singing-bambu-trees-near-river-i-recorded-bo>)